




Specjalne ostrzeżenia: przypadkowa samoiniekcja szczepionki dla ryb

W razie przypadkowej samoiniekcji igłą,
która miała kontakt ze szczepionką dla ryb,
niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem – nawet
jeśli uważasz, że nie doszło do wstrzyknięcia.

Postępuj zgodnie z następującymi trzema krokami:



Niezwłoczny kontakt z lekarzem

Nawet niewielka ilość
szczepionki może wywołać
poważne reakcje.

Przekazanie informacji lekarzowi

Przedstaw lekarzowi ulotkę
dołączoną do opakowania
oraz/lub broszurę PHARMAQ
dotyczącą przypadkowej
samoiniekcji.

Obserwacja i ponowna konsultacja

Jeśli po upływie 12 godzin
nadal odczuwasz ból, obrzęk,
gorączkę lub zauważasz
zmianę koloru skóry, ponownie
skontaktuj się z lekarzem.

Ważne numery telefonów:

Lokalna przychodnia:

Lokalny oddział ratunkowy:

Numer alarmowy:

Zgłoszenie do PHARMAQ: Wyślij
e-mail na adres phvig@pharmaq.no
lub skontaktuj się ze swoim
przedstawicielem PHARMAQ.

WAŻNE INFORMACJE

