

## Control de recepción de la vacuna

Fecha de recepción		Tipo de vacuna	
Tiempo de traslado		Batch nº	
Método de entrega		Fecha a utilizar	
		Cantidad (lts)	
Medidor de temperatura	OK? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
	Comentarios		

### Posible separación de fases de la vacuna

Las bolsas de vacuna pueden ser inspeccionadas visualmente cuando están almacenadas (por ej. en el refrigerador). Evite agitar las bolsas antes que se verifique la posible fase en el fondo de esta.

Una fase de color café en el fondo de la bolsa (fig. 4), indica que la emulsión de la vacuna se ha separado. Esta vacuna no se debe ser utilizada. Es normal encontrar una fase superior de aceite en la bolsa antes que la vacuna se agite y no indica un problema (fig. 2 y 3). Si tiene dudas, por favor, póngase en contacto con personal de Pharmaq o su veterinario inmediatamente.

**Revise la vacuna como se indica. Si la vacuna es recibida inmediatamente antes de la vacunación realizar sólo el punto 1.**

#### 1. Control en la recepción:

Revise un 10% de las bolsas, pero no más de 10 bolsas. Realizar una inspección visual de la separación de fases o el cambio de color en la parte inferior de la bolsa.

#### 2. Revisar las bolsas 2 - 3 días antes del inicio de la vacunación:

Proceder igual que en el punto 1.

Nota: La vacuna debe agitarse justo antes de su uso hasta que el aceite se mezcle con la emulsión (fig. 1).



**Figura 1**  
Vacuna homogénea



**Figura 2**  
Fase aceitosa superior es normal durante el almacenamiento



**Figura 3**



**Figura 4**  
Vacuna con fases separadas

Número de bolsas revisadas:		OK? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha/firma
Número de bolsas revisadas antes de su uso:		OK? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha/firma

### Comentario

Si la vacuna no es recepcionada según lo indicado, si los medidores de temperatura indican que se perdió la cadena de frío o si la revisión descrita indica que por separación de fases la vacuna NO puede ser utilizada. Contacte de inmediato al médico veterinario responsable y al jefe del centro. Deje la vacuna en cuarentena en un refrigerador hasta que sea inspeccionada. Si la vacuna es declarada en buenas condiciones, mantener refrigerada (2 - 8°C) hasta su uso. En el refrigerador asegúrese que hay suficiente espacio para circulación de aire, y que las bolsas de vacuna no están en contacto directo con los paneles de refrigeración.