



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

# ΑΥΤΟΕΝΕΣΗ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΟ ΨΑΡΙΩΝ

## ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

*Η άμεση αντίδραση είναι σημαντική για να αποφευχθούν μόνιμες βλάβες.*

Η αυτοένεση με εμβόλιο ψαριών, ακόμα και σε μικρή ποσότητα, μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, οίδημα και σε σπάνιες περιπτώσεις νέκρωση ιστών που μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό. Ο γιατρός πρέπει να αξιολογήσει μέσω της τραυματισμένης περιοχής και αν χρειαστεί να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>

# ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

## 1 Επείγουσα αξιολόγηση

Η τραυματισμένη περιοχή πρέπει να εξεταστεί αμέσως από επαγγελματία υγείας με χειρουργική εμπειρία.

## 2 Προεγχειρητική εκτίμηση κινδύνου

Πρέπει να γίνει λεπτομερής ιατρική αξιολόγηση πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση.

## 3 Άνοιγμα και παροχέτευση

Εάν έχει γίνει ένεση εμβολίου, ειδικά σε δάχτυλο ή μαλακό ιστό, απαιτείται χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση της περιοχής

## 4 Επιφανειακές γρατζουνιές

Εάν η βελόνα έχει μόνο γρατζουνίσει το δέρμα χωρίς ένεση, μπορεί να εμφανιστεί τοπικό οίδημα. Ο γιατρός πρέπει να αξιολογήσει και να αποφασίσει για την κατάλληλη θεραπεία.

## 5 Παρακολούθηση

Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται μετά τη θεραπεία για να εκτιμηθεί η ανάγκη για περαιτέρω παρέμβαση.

**ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>**

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

## Σύγχρονα εμβόλια ψαριών

- Φορμαλίνη-αδρανοποιημένα αντιγόνα βακτηρίων/ιών
- Ορυκτέλαια ως βοηθητικά



Συνήθης δόση: 0,025–0,1 ml, συνήθως εγχέεται στην κοιλιακή χώρα του ψαριού. Σε τυχαία αυτοένεση, ο εμβολιαστής μπορεί να λάβει ολόκληρη τη δόση, συνήθως στο χέρι ή στο δάχτυλο.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>

## ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

- **Κίνδυνος νέκρωσης ιστών και ακρωτηριασμού:** Τα ορυκτέλαια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στους ιστούς. Η χειρουργική επέμβαση (τομή, έκπλυση) είναι απαραίτητη.
- **Συστηματικά συμπτώματα:** Τοπικός πόνος, οίδημα, λεμφαδενίτιδα στο χέρι, πυρετός, ναυτία και έμετος.
- **Αναφυλακτικό σοκ (σπάνιο):** Πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Όλες οι ύποπτες περιπτώσεις πρέπει να διερευνώνται και να αναφέρονται.

**Σημείωση:** Τα αντιβιοτικά και τα αντιφλεγμονώδη δεν επαρκούν ως μοναδική θεραπεία. Η ένεση τετάνου δεν είναι απαραίτητη. **Η χειρουργική αξιολόγηση είναι απαραίτητη.**

### ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!

Όλες οι περιπτώσεις αυτοένεσης με εμβόλιο ψαριών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επείγουσα χειρουργική κατάσταση.